

DDAVP (desmopressin) Therapy

Your provider has prescribed DDAVP (desmopressin) to help decrease your child's bedwetting. The medication concentrates the urine so that less is produced.

It is very important to drink only the smallest amount of water needed to swallow the DDAVP tablet/s, and not to drink any fluids after the pills have been taken.


Instructions


- 1** Limit the amount of fluid that is consumed after dinner. Your child should decrease liquid intake 2-3 hours before bedtime.
- 2** Have the child urinate 1 hour before bedtime then again immediately before bedtime.
- 3** Have your child drink only a sip of water while taking the pills at night.


Continue the medication on the lowest dose resulting in a dry night (either 1, 2 or 3 tablets) every night.

After 6 Months of Taking DDAVP

Have your child take 1 fewer DDAVP tablets for 1 week (most families prefer to reduce/stop the DDAVP during school breaks). See how your child responds.

If your child remains dry

 Give the DDAVP at the reduced dose for 1 week. If your child is still dry, continue reducing by 1 tablet each week until none are needed.

If your child begins bedwetting again

 Restart the DDAVP. Give the same number of tablets as before.



Terapia con DDAVP (desmopresina)

Su proveedor médico le ha recetado DDAVP (desmopresina) para ayudar a que su niño no se orine tanto en la cama. Este medicamento concentra la orina para que se produzca menos.

Es muy importante que beba solamente la mínima cantidad de agua necesaria para poder tragar las pastillas DDAVP y que no ingiera ningún líquido después de haber tomado las pastillas.

Instrucciones

- 1** Limite la cantidad de líquidos consumidos después de la cena. Su niño debe comenzar a disminuir esta ingesta de líquidos 2-3 horas antes de acostarse.
- 2** Haga que su niño orine 1 hora antes de acostarse y otra vez justo antes de irse a la cama.
- 3** Haga que su niño se tome las pastillas con solo un sorbo de agua antes de acostarse.

Siga dándole la medicina en la dosis más baja que sea efectiva (ya sea 1, 2 o 3 pastillas) cada noche.

Después de 6 meses de tomar DDAVP

Haga que su niño tome 1 pastilla menos de DDAVP durante 1 semana (la mayoría de las familias prefieren reducir/suspender DDAVP durante las vacaciones escolares). Vea como responde su niño.

Si su niño se mantiene seco

Dele DDAVP a la dosis reducida durante 1 semana. Si su niño sigue manteniéndose seco, siga reduciendo 1 pastilla cada semana hasta que ninguna sea necesaria.

Si su niño comienza de nuevo a orinarse en la cama

Reanude DDAVP. Dele el mismo número de pastillas que le daba anteriormente.

Fecha							
DDAVP 1 Pastilla	●	●	●	●	●	●	●

¿Seco por la noche? → **SI**

Continúe a dándole 1 pastilla 1 hora antes de acostarse con 2-4 cucharadas de agua, durante 6 meses

NO

Fecha							
DDAVP 2 Pastillas	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●

¿Seco por la noche? → **SI**

Continúe a dándole 2 pastillas 1 hora antes de acostarse con 2-4 cucharadas de agua, durante 6 meses

NO

Fecha							
DDAVP 3 Pastillas	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●

¿Seco por la noche? → **SI**

Continúe a dándole 3 pastillas 1 hora antes de acostarse con 2-4 cucharadas de agua, durante 6 meses

NO

Por favor llame para programar una cita