



Long-term Antibiotic Use to Prevent UTIs

Children who are diagnosed with vesicoureteral reflux (VUR) following a urinary tract infection (UTI) are at risk for kidney scarring with more UTIs. Research shows that children receiving a preventative long-term dose of antibiotic medication have fewer UTIs than those who do not take any preventative medication.

INSTRUCTIONS FOR ANY CHILD TAKING PREVENTATIVE ANTIBIOTICS FOR UTIs

- Give your child the antibiotic medication every day.
- Have urine tests ordered at every pediatrician visit particularly when your child is sick.
- Have a CBC blood test done every 6 months if your child is on Bactrim, Septra or Sulfatrim (These medications can cause a low blood count.) Have the test results sent to Urology if done outside of our clinic.
- Repeat X-rays one year from last ones before a follow-up visit with Urology.
 - Call 832-826-5303 to schedule the X-rays.
 - Call 832-822-2778 to schedule the Urology appointment.
- Call the Urology Clinic if your child has any additional UTIs.
- Look for any of these signs of infections:
 - Fever
 - Burning feeling when urinating
 - Wetting (older children)
 - Urgency to urinate (older children)
 - Frequency of urinating (older children)
 - Poor appetite
 - More irritable than usual
 - Nausea or vomiting
 - Blood in urine



El uso de Antibióticos a Largo Plazo para la Prevención de Infecciones de Vías Urinarias

Los niños diagnosticados con reflujo vesicoureteral (VUR) después de infección de las vías urinarias (UTI) tienen riesgo de cicatrización renal (nefroesclerosis) presentando de presentar más infecciones de vías urinarias. La investigación demuestra que aquellos niños que reciben una dosis preventiva de antibióticos a largo plazo presentan menos UTIs que aquellos que no reciben ningún medicamento preventivo.

LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES SON PARA TODO NIÑO QUE ESTÁ TOMANDO ANTIBIÓTICO PARA LA PREVENCIÓN DE UTIs

- Dele a su niño el medicamento antibiótico cada día.
- Ordene un análisis de orina en cada visita al pediatra, particularmente cuando su niño esté enfermo.
- Ordene un examen de sangre CBC (Biometría Hemática) cada 6 meses si su niño está recibiendo Bactrim, Septra o Sulfatrim (Estos medicamentos pueden causar una disminución del nivel de glóbulos en la sangre). Pida que los resultados sean enviados a Urología si se hicieron fuera de nuestra clínica.
- Repita los rayos x en un año, antes de una cita de control en Urología.
 - Llame al tel. 832-826-5303 para programar los rayos x.
 - Llame al tel. 832-822-2778 para hacer una cita con Urología
- Llame a la Clínica de Urología si su niño presenta Infecciones de vías urinarias (UTIs) adicionales.
- Vigile estas señales de infección:
 - Fiebre
 - Sensación de ardor al orinar
 - Mojarse (en niños mayores)
 - Urgencia urinaria (en niños mayores)
 - Frecuencia urinaria (en niños mayores)
 - Poco apetito
 - Mas irritable de lo usual
 - Nausea o vómito
 - Sangre en la orina